



## Inotuzumab Ozogamicine

Andere naam: Besponsa®

### Wat is het en hoe werkt het?

Een monokonaal antilichaam gecombineerd met een celdelingremmend medicijn. Het antilichaam bindt zich aan het eiwit CD22 op het oppervlak van kankercellen waarna het medicijn de kankercellen vernietigt.

### Hoe ziet het eruit en hoe wordt het gegeven?

Een heldere vloeistof die via een ader (intraveneus) als infuus gegeven wordt.

### Bijwerkingen op korte termijn (binnen 24 uur)

- Koorts, rillingen
- Hoofdpijn
- Hoesten
- Reacties op het infuus zoals lage bloeddruk, opvliegers, ademhalingsproblemen

### Bijwerkingen op langere termijn

- Verminderde eetlust
- Vermoeidheid
- Diarree, misselijkheid, obstipatie, buikpijn
- Verlaging van het aantal witte en rode bloedcellen en bloedplaatjes
- Meer kans op infecties

- Meer kans op bloedingen
- Verminderde werking van de lever

### Bijzonderheden

- Voor het toedienen krijgt je kind medicijnen tegen pijn/koorts en om een overgevoeligheidsreactie te voorkomen.
- Er wordt regelmatig bloed afgenomen om te kijken hoe de werking van de lever is.

### Speciale instructies

- Sommige kinderen krijgen een overgevoeligheidsreactie. De verpleegkundige controleert daarom tijdens en na het toedienen regelmatig bloeddruk, pols, ademhaling en temperatuur.
- Waarschuw de arts of verpleegkundige als je merkt dat je kind het benauwd krijgt, huiduitslag of koude rillingen heeft.